

The background of the slide features a photograph of three men shaking hands in front of a building. On the left is a woman with short dark hair wearing a green and white plaid shirt. In the center is a man with short grey hair wearing a light-colored shirt. On the right is a man with glasses and brown hair wearing a light blue button-down shirt. A semi-transparent yellow rectangle is overlaid on the image, containing the title text.

KONCEPCIA PORADENSTVA SPOLOČNOSTI SANO V OBLASTI VÝŽIVY OŠÍPANÝCH

Mladé prasnice

VITAJTE

Vážený zákazník,

vážený záujemca o naše výrobky,

sme veľmi radi, že vás koncepcia výživy mladých prasníc od spoločnosti Sano zaujala.

Na nasledujúcich stranách nájdete dôležité informácie o výžive ošípaných v týchto štádiách:

- štádium odchovu I
- štádium odchovu II

Odpovede na vaše otázky vám radi poskytneme na telefónnom čísle +421 2 653 16 570 alebo e-mailom na adrese sano@sano.sk.

Štádium odchovu I

ŠTÁDIUM ODCHOVU I



Informácie o období života: štádium odchovu I

Vaším cieľom pri odchove mladých prasníc sú zdravé a plodné chovné prasnice so stabilnými základmi a vysokou úžitkovosťou počas svojho života. Preto sa mladá prasnica nesmie inseminovať príliš skoro. Pohlavné orgány potrebujú určitý čas na dokončenie vývinu a mladá prasnica si potrebuje vytvoriť dostatočné tukové zásoby (hrúbka chrbtového tuku: 18 – 20 mm). Tieto tukové zásoby sú dôležité, pretože v tukovom tkanive sa ukladajú pohlavné hormóny a vitamíny rozpustné v tuku. Ak je tuková zásoba príliš malá, vyvíjajú sa folikuly vo vaječníkoch nedostatočne a vznikajú problémy s rujou. Mladé prasnice okrem toho nevyhnutne potrebujú dostatočné tukové zásoby, ktoré slúžia ako zásobník energie, ktorý im poskytuje potrebnú energiu na tvorbu mlieka v období cicania.

Výživa mladých prasníc však nesmie byť príliš intenzívna, pretože kostra nedokáže udržať rýchly nárast hmotnosti. Negatívne sa to potom prejavuje na stabilite nôh, kĺboch či pazúroch. S chorými prasnicami sa zvyšuje miera vyradenia.

Ak chcete dosiahnuť veľmi dobrú plodnosť a dlhý úžitkový vek vašich mladých prasníc, mali by ste zabezpečiť, aby boli splnené nasledujúce podmienky:

- prvé inseminovanie vo veku 7,5 až 8,5 mesiaca
- hmotnosť pri prvej inseminácii: 130 až 140 kg
- prvá inseminácia pri 2. až 3. ruji
- denné prírastky 650 až 700 g od hmotnosti 30 kg až do prvej inseminácie
- prírastok hmotnosti do prvého opasenia: 75 kg

ŠTÁDIUM ODCHOVU

I



Informácie o období života: štádium odchovu I

V prvom štádiu odchovu (30 – 70 kg) sa mladé prasnice musia živiť intenzívne.

Preto zvieratám podávajte približne 23 MJ ME/deň (17 – 29 MJME/deň). To predstavuje priemernú dennú dávku krmiva 1,8 kg (1,3 – 2,2 kg/deň).

Na začiatku odchovu rovnako dbajte na nízku väzobnú kapacitu kyselín v krmiva a na prísun zložiek, ktoré stabilizujú trávenie. Tým znížite výskyt ochorení spojených s príjmom krmiva.

Vaše mladé prasnice kladú vysoké nároky na krmivo, ktoré im poskytujete. Preto im do krmiva pre mladé prasnice do približne 70 kg primiešajte 3 % produktu **Aminogold® Forte** a 0,5 % produktu **SanoCid®**.

Koncepcia výživy od spoločnosti Sano je zameraná na dosahovanie osobitných úžitkových cieľov v prvom štádiu odchovu:

- stabilná kostra
- veľmi dobrá plodnosť
- dlhý úžitkový vek

Ak vás táto koncepcia zaujala, kontaktujte odborného poradcu spoločnosti Sano ešte dnes.

Na vaše ďalšie otázky vám radi odpovieme aj telefonicky na čísle +421 2 653 16 570 alebo e-mailom na adrese sano@sano.sk.

Štádium odchovu II

ŠTÁDIUM ODCHOVU II



Informácie o období života: Štádium odchovu II

Vaším cieľom pri odchove mladých prasníc sú zdravé a plodné chovné prasnice so stabilnými základmi a vysokou úžitkovosťou počas svojho života.

Preto sa mladá prasnica nesmie inseminovať príliš skoro. Pohlavné orgány potrebujú určitý čas na dokončenie vývinu a mladá prasnica si potrebuje vytvoriť dostatočné tukové zásoby (hrúbka chrbtového tuku: 18 – 20 mm). Tieto tukové zásoby sú dôležité, pretože v tukovom tkanive sa ukladajú pohlavné hormóny a vitamíny rozpustné v tuku. Ak je tuková zásoba príliš malá, vyvíjajú sa folikuly vo vaječníkoch nedostatočne a vznikajú problémy s rujou. Mladé prasnice okrem toho nevyhnutne potrebujú dostatočné tukové zásoby, ktoré slúžia ako zásobník energie, ktorý im poskytuje potrebnú energiu na tvorbu mlieka v období cicania. Výživa mladých prasníc však nesmie byť príliš intenzívna, pretože kostra nedokáže udržať rýchly nárast hmotnosti. Negatívne sa to potom prejavuje na stabilite nôh, kĺboch či pazúroch. S chorými prasnicami sa zvyšuje miera vyradenia.

Pri zaradovaní mladých prasníc s hmotnosťou približne 90 až 95 kg do stáda prasníc dbajte na to, aby ste prasniciam poskytli dostatočnú dobu na toto zaradenie v trvaní 6 týždňov v osobitnej karanténnej stanici. Počas tejto doby ich pozorne pozorujte a konzultujte s veterinárom. Týmto spôsobom zabránite zavlečeniu a rozšíreniu nákaz a ochorení do stáda.

Dobrá rozmnožovací potenciál a dlhý úžitkový vek mladých prasníc dosiahnete vtedy, keď prasnice prvýkrát pripustíte k inseminácii až po dosiahnutí telesnej hmotnosti 130 – 140 kg. Pri prvej inseminácii mladých prasníc by hrúbka chrbtového tuku nemala byť menšia ako 18 mm. V opačnom prípade sa znižuje veľkosť vrhu.

ŠTÁDIUM ODCHOVU II



Informácie o období života: Štádium odchovu II

Mladé prasnice sa k inseminácii pripúšťajú vtedy, keď ešte nie sú úplne dospelé. Preto sa do prvého opasenia snažte o to, aby ste dosiahli prírastok hmotnosti 75 kg (> 200 kg do prvej laktácie). Ak chcete dosiahnuť veľmi dobrú plodnosť a dlhý úžitkový vek vašich mladých prasníc, mali by ste zabezpečiť, aby boli splnené nasledujúce podmienky:

- prvé inseminovanie vo veku 7,5 až 8,5 mesiaca
- hmotnosť pri prvej inseminácii: 130 až 140 kg
- prvá inseminácia pri 2. až 3. ruji
- denné prírastky 650 až 700 g od hmotnosti 30 kg až do prvej inseminácie
- prírastok hmotnosti do prvého opasenia: 75 kg

Od hmotnosti 70 kg podávajte mladým prasniciam prídely krmiva až do inseminácie a zvýšte obsah vlákniny.

V tomto období zvyšujte denné množstvo krmiva z približne 29 na približne 36 MJME. Po dosiahnutí telesnej hmotnosti 120 kg podporte rast tukových zásob mladých prasníc a až do pripustenia k inseminácii zvýšte denný príjem energie až na 40 MJME (metóda kŕmenia flushing). Podávajte prasniciam 10 až 14 dní pred insemináciou 3 kg krmiva denne a denne ku krmivu pridávajte aj 150 až 200 g produktu **SanEnergy**® a 25 g produktu **Fertisan Sauen**®. V prevádzkach, ktoré mladé prasnice kupujú od iných dodávateľov, sa prasnice kŕmia 3 kg krmiva pre prasné prasnice s prípravkom **Fasersan Trag**®, k čomu sa pridáva 150 až 200 g prípravku **SanEnergy**® a 25 g prípravku **Fertisan Sauen**® denne. Týmto spôsobom zvýšite mieru ovulácie a tým aj počet živo narodených prasiatok v prvom vrhu. Mladé prasnice po úspešnej inseminácii kŕmte produktom **Fasersan Trag**® podľa koncepcie výživy prasných prasníc od spoločnosti Sano.

ŠTÁDIUM ODCHOVU II



Informácie o období života: Štádium odchovu II

Vaše mladé prasnice kladú vysoké nároky na krmivo, ktoré im poskytujete. Preto im do krmiva do doby inseminácie pridávajte 2,5 % produktu **Saugengold Trag®**.

Saugengold Trag®

- zabezpečuje dobrý príjem krmiva
- zvyšuje odolnosť
- zabezpečuje stabilnú kostru a pazúry
- podporuje rovnomerný rast
- podporuje vysokú plodnosť

Na zlepšenie ruje a zvýšenie plodnosti podávajte prasniciam dodatočne aj 25 g produktu Fertisan Sauen® denne, a to 2 až 3 týždne pred insemináciou.

Koncepcia výživy od spoločnosti Sano je zameraná na dosahovanie osobitných úžitkových cieľov v druhom štádiu odchovu:

- stabilná kostra
- veľmi dobrá plodnosť
- dlhý úžitkový vek

Ak vás táto koncepcia zaujala, kontaktujte odborného poradcu spoločnosti Sano ešte dnes.

Na vaše ďalšie otázky vám radi odpovieme aj telefonicky na čísle +421 2 653 16 570 alebo e-mailom na adrese sano@sano.sk.



Ďakujeme za váš záujem o koncepciu výživy mladých prasníc od spoločnosti Sano.

Na vaše otázky vám radi kedykoľvek odpovieme na telefónnom čísle +421 2 653 16 570 alebo e-mailom na adrese sano@sano.sk



Sano