

The background of the slide features a photograph of three men in a friendly interaction. On the left, a man with dark hair in a green and white plaid shirt looks towards the center. In the middle, a man with grey hair in a light-colored shirt is shaking hands with a man on the right. The man on the right has glasses and is wearing a light blue button-down shirt. They are standing in front of a building with a textured wall and a window. A yellow semi-transparent rectangle is overlaid on the center of the image, containing the title text.

KONCEPCIA PORADENSTVA SPOLOČNOSTI SANO V OBLASTI VÝŽIVY OŠÍPANÝCH

Chovné prasnice

VITAJTE

Vážený zákazník,

vážený záujemca o naše výrobky,

sme veľmi radi, že vás koncepcia výživy chovných prasníc od spoločnosti Sano zaujala.

Na nasledujúcich stranách nájdete dôležité informácie o výžive v čase

- prasnosti
- prípravy na oprasenie cicania
- jalových dní

Odpovede na vaše otázky vám radi poskytneme na telefónnom čísle +421 2 653 16 570 alebo e-mailom na adrese sano@sano.sk.

Obdobie prasnosti

OBDOBIE PRASNOSTI



Informácie o období života: obdobie prasnosti

V prvom štádiu prasnosti, t. z. počas troch až štyroch týždňov po inseminovaní, sa prasnice nesmú kŕmiť krmivom s príliš vysokým obsahom energetických látok, pretože to zvyšuje mieru prebiehania a znižuje veľkosť vrhu.

Vaše zvieratá preto kŕmte len približne 2,3 kg krmiva denne (približne 28 MJ ME).

Do 85. dňa prasnosti sa vaše prasnice musia dostať do telesného stavu, ktorý je optimálny pre opasenie.

Tento stav je dôležitý pre priebeh pôrodu, produkciu mlieka a reprodukčný potenciál. Ak napríklad prasnice dosahujú čas opasenia s príliš vysokým obsahom tuku, zvyšuje sa frekvencia ťažkých pôrodov. Ak zase zvieratá po opasení prijímajú príliš málo krmiva, musia v laktačnom období mobilizovať a vyčerpávať svoje zásoby tuku.

To zase v ďalšej fáze vedie k reprodukčným problémom, ako je napríklad oneskorená ruja, potraty, nižšia veľkosť vrhu a zvýšená miera prebiehania. A tak platí, že „prasnice, ktoré chudnú, sa neoprasia.“ Pred opasením sa preto snažte dosiahnuť kondičný stupeň 3,5 až 4 pri starých prasniciach a kondičný stupeň 4 pri mladých prasniciach.

OBDOBIE PRASNOSTI



Koncepcia výživy od spoločnosti Sano je zameraná na dosahovanie osobitných úžitkových cieľov v období prasnosti:

- množstvo vrhov od jednej prasnice a v jednom roku
- účinná prevencia výskytu syndrómu MMA
- množstvo živo narodených a silných prasiatok

Ak vás táto koncepcia zaujala, kontaktujte odborného poradcu spoločnosti Sano ešte dnes. Na vaše ďalšie otázky vám radi odpovieme telefonicky na čísle +421 2 653 16 570 alebo e-mailom na adrese sano@sano.sk.

Príprava na oprasenie

PRÍPRAVA NA OPRASENIE



Informácie o období života: príprava na opasenie

Obdobie gravidity môže u ošípaných trvať od 110 do 120 dní. Preto je potrebné, aby ste vaše prasnice dôkladne umyli a presunuli ich do priestorov na opasenie už týždeň pred plánovaným termínom opasenia.

Výhodou tohto presunu je, že svojim zvieratám a ich imunitnému systému poskytnete dostatočný čas na to, aby sa dokázali prispôsobiť novému prostrediu. Prasnica si tak vytvorí špeciálne protilátky, ktoré sú prispôbené tomuto prostrediu a po opasení chránia prasiatka, ktoré ich prijímajú v mlezive.

Aj vaše prasnice vo vysokom štádiu prasnosti potrebujú dostatok vlákniny, ktorá im zabezpečí optimálne trávenie. Nedostatok vlákniny môže spôsobiť zápchu s vážnymi následkami. Toxíny, ktoré produkujú baktérie v črevách prasníc, sa môžu ľahko dostať do krvného obehu a spôsobiť zápal mliečnych žliaz (mastitída) a nedostatok mlieka (agalakcia). Okrem toho sa

krátko pred opasením otvoria pôrodné cesty prasnice. Choroboplodné zárodky tak môžu ľahko preniknúť do maternice a vyvolať zápal (metritída).

PRÍPRAVA NA OPRASENIE



Koncepcia výživy od spoločnosti Sano je zameraná na dosahovanie osobitných úžitkových cieľov v období prípravy na oprasenie:

- účinná prevencia výskytu syndrómu MMA
- bezproblémový, plynulý priebeh oprasenia
- množstvo zdravých a silných prasiatok

Ak vás táto koncepcia zaujala, kontaktujte odborného poradcu spoločnosti Sano ešte dnes.

Na vaše ďalšie otázky vám radi odpovieme telefonicky na čísle +421 2 653 16 570 alebo e-mailom na adrese sano@sano.sk.

Obdobie cicania

OBDOBIE CICANIA



Informácie o období života: obdobie cicania

Informácie o období života: obdobie cicania

V období cicania, t. z. aspoň 21 dní, sa naša pozornosť sústreďuje na tvorbu mlieka a zníženie strát hmotnosti vašich prasníc.

Lebo platí, že „**prasnica, ktorá chudne, sa neoprasí**“. To znamená, že ďalšie inseminovanie príliš vyčerpaných prasníc je ohrozené. Pri príliš veľkých stratách telesnej hmotnosti sa znižuje aj veľkosť vrhu.

Na dosiahnutie uvedených úžitkových cieľov musí prasnica prijímať energeticky nasýtené krmivo a krmivo s optimálnym zložením živín. Pri vysokej produkcii mlieka nie je možné zabrániť stratám hmotnosti v rozsahu od 15 do 20 kg.

Denný príjem vlastnej chovnej dávky krmiva prasnice (približne 1,5 kg krmiva) je potrebné zvýšiť o 0,5 kg pre každé prasiatko (na produkciu mlieka), aby sa predišlo výraznejším stratám hmotnosti a tým aj reprodukčným poruchám a problémom s rujou.

Krmiaca prasnica využíva na tvorbu mlieka asi 80 % energie z krmiva!

OBDOBIE CICANIA



Koncepcia výživy od spoločnosti Sano je zameraná na dosahovanie osobitných úžitkových cieľov v období cicania:

- vysoký príjem krmiva a vysoká produkcia mlieka
- nízke straty cicajúcich prasiatok
- množstvo prasiatok s vysokou hmotnosťou po odstavení

Ak vás táto koncepcia zaujala, kontaktujte odborného poradcu spoločnosti Sano ešte dnes.

Na vaše ďalšie otázky vám radi odpovieme telefonicky na čísle +421 2 653 16 570 alebo e-mailom na adrese sano@sano.sk

Obdobie jalových dní

OBDOBIE JALOVÝCH DNÍ



Informácie o období života: obdobie jalových dní

Podávajte prasniciam krivo s laktačnou zmesou aj po presunutí do oplodňovacej stanice, aby ste predišli zmene krmiva.

U **mladých prasníc** sa spravidla vytvorí 12 až 18 vajíčok, ktoré sú schopné oplodnenia, a ich počet rastie medzi prvou a treťou rujou. Preto by mali byť mladé prasnice prvýkrát inseminované až po prvej ruji.

U **starých prasníc** sa zvyčajne vytvorí 20 až 24 vajíčok. To vysvetľuje, prečo sú vrhy od mladých prasníc vždy o niečo menšie.

Pred narodením prasiatok odumiera spolu približne 60 % zo všetkých oplodnených vaječných buniek. Preto je potrebné, aby ste zvýšením množstva krmiva na 40 MJ ME, resp. 3 kg krmiva pre každé zviera na deň (metóda kŕmenia flushing) pred inseminovaním zvýšili počet vajíčok, ktoré sú schopné oplodnenia. Týmto spôsobom zlepšíte tvorbu tuku pred inseminovaním najmä u vyčerpaných starých a mladých prasníc, čo zvyšuje mieru ovulácie. Čím viac vajíčok sa vytvorí, tým viac vajíčok sa oplodní a zahniezdi v maternici. To zvyšuje počet živo narodených prasiatok.

OBDOBIE JALOVÝCH DNÍ



Informácie o období života: obdobie jalových dní

Ak krmivo pre oprasené prasnice podávate už prasniciam v oplodňovacej stanici, môžete k nemu pridávať 200 g krmiva **SanEnergy**[®], čím zvýšite príjem energie.

V oplodňovacej stanici by sa zvieratá mali rýchlo dostať do ruje a úspešne inseminovať. Hormonálne procesy sa preto musia optimalizovať prísunom ďalších vitamínov a stopových prvkov.

Na krmivo pre jalové prasnice sa kladú vysoké nároky. Preto prasniciam v tomto štádiu naďalej podávajte laktačnú krmnú zmes s 3,5-percentným obsahom produktu **Sauengold Lac**[®] a 5-percentným obsahom produktu **SanEnergy**[®]. Okrem toho podávajte denne každému zvieraťu 25 g produktu **Fertisan**[®] pre prasnice na simuláciu ruje.

Týmto spôsobom

- poskytnete svojim prasniciam všetky dôležité účinné látky pre optimálny reprodukčný potenciál,
- zvýšite mieru ovulácie,
- stimulujete ruju,
- zlepšíte úspešnosť oplodnenia.

OBDOBIE JALOVÝCH DNÍ



Koncepcia výživy od spoločnosti Sano je zameraná na dosahovanie osobitných úžitkových cieľov v období jalových dní:

- dobre viditeľná a výrazná ruja
- množstvo vaječných buniek, ktoré sú schopné oplodnenia
- úspešná inseminácia 4 až 7 dní po odstavení

Ak vás táto koncepcia zaujala, kontaktujte odborného poradcu spoločnosti Sano ešte dnes.

Na vaše ďalšie otázky vám radi odpovieme telefonicky na čísle +421 2 653 16 570 alebo e-mailom na adrese sano@sano.sk



Ďakujeme za váš záujem o koncepciu výživy chovných prasníc od spoločnosti Sano.

Na vaše otázky vám radi kedykoľvek odpovieme na telefónnom čísle +421 2 653 16 570 alebo e-mailom na adrese sano@sano.sk.

Sano